

Nee, dit is niet zoals je soms zou denken een poging om een rekord te vestigen (je zou dan trouwens bij de havengeulen wel effekens mogen zwemmen), maar wel een lofwaardig initiatief waar de 'SWG-kern' (vorige herfst mee van start gegaan is. Met nu eens 1, dan weer 7 entoesiastelingen) werden er gedurende 4 dagen "kruisteekproeven" genomen tussen de Zvingeul en de Oostendse havengeul. Hiermee bedoelen we het volgende: Op de totale afstand van pluusminuis 35 Km werden er 5 plaatsen uitgekozen die zowat op een gelijke afstand van elkaar lagen (en waarschijnlijk nog altijd liggen). Daar werd dan met zo kort mogelijke tussentijd (ieder laagwater dus) een aantal keren 10 minuten aan een stuk gekruid (hoe meer slepen hoe liever).

Dit kwam dus neer op:

- donderdag 6/9/'79 vanaf 18u30 : 4 slepen voor 't zwembad Knokke.
-vrijdag 7/9/'79 vanaf 20u : 4 slepen voor Heist-Duinbergen.
-zaterdag 8/9/'79 vanaf 8u24 : 6 slepen voor Zeebrugge (Oude muur)
 vanaf 19u20 : 8 slepen voor Wenduine
-zondag 9/9/'79 vanaf 9u20 : 5 slepen voor Bredene Hippodroom.

Laagwater was het respektievelijk om 20u40 (do); 21u27 (vrij); 9u36.22u14 (za) en 10u22 (zo).

Oostende kon 's avonds niet meer gedaan worden doordat het laagwater te laat viel, en de dag daarop ook niet door het tekort aan werkvolk. (: 's maandags).

Het zou natuurlijk heel interessant worden als we de andere kant (Oostende-De Panne) er ook bij konden nemen; en dat we bvb met 2 netten zouden werken om zo het tijdsverschil en 't verschil in weersomstandigheden zo miniem mogelijk te maken.

Den beetje meer trekkrachten had beslist ook aangenamer geweest voor Henri, zodat hij zich niet altijd zelf ' voor 't net moest spannen'.

Ik hoop wel dat zoiets ieder jaar herhaald zou kunnen worden (1 keer in de lente én 1 keer in de herfst zal waarschijnlijk té utopisch zijn) , zodat we ons na een aantal jaren een globaal beeld kunnen vormen van de fauna vlak voor de kust (en de eventuele wijzigingen).

Maar, zoals gezegd, wat meer netten en entoesiastelingen zou enorm prakties zijn.

Voorlopig zullen we dan al maar beginnen met de 1ste resultaten te publiceren (een uitwerking hiervan alleen zou weinig nut hebben en hoogstwaarschijnlijk een verkeerd beeld geven van de situatie).

Nog een kleine opmerking over de volgende bladzijden:

Sommige stukken werden 's avonds, anderen 's morgens gekruidd.

Dus is het ook logies dat er in 't eerste geval meer dieren werden gevestigd die vooral 's nachts actief zijn (vb tong).

Hier dient bij een interpretatie van de gegevens ook wel rekening mee te worden gehouden.

	6/9/'79 Kiekkie				Don- 7/9/'79 bergen			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Tong	7	3	11	7	1	3	8	7
Sprot	1	12		1				
Tarbot		1				1	1	1
Pladijs		5	3	4	2			
Griet								
Schar								
Bot								
Pitvis		1						
Zeedonderpad				1				
5-dradije meun				1				
Slakdolf								
Dikkopje								
Haring						2	1	
Kl. zeenaald								
Zeebaars								
Kl. pieterman								
Wijting								
Harnasmannetje								
Strandkrab ♂	4	3	6	11	19	15	±50	4
♀	2	5	6	11	35	35		
Zwemkrab ♂	1	3	10	18		1		
♀	1	5	12	34				
Garnalen	±100		±150		±35		±100g ±150g	
Ribkwal	2				1			
Kompaskwal								
Zeepaddestoel								
Eutonina indicans	10							
Idotea linearis								

7/9/'79: 't was nogal een slijkerige boel. De 2de sleep duurde niet zo lang omdat 't net bleef steken in 't slijk, en voor de 4de sleep werd de ketting van 't net gehaald omdat dat anders niet meer voort te krijgen was.

8/9/179 Zeebrugge						Wenduine			
8.24	8.45	9.10	9.25	9.40	10.05	19.20	19.45	20.00	20.20
8.34	8.55	9.20	9.35	9.55	10.15	19.30	19.55	20.10	20.30
T	1		1		1	3	1	3	
S		2							
T 2	1			1	2				
P 3	4			2	5	10	6	8	7
G 2	2				2	1			1
S			1						
B					1				
P				1					4
Z									
5m									2
S 1		1	1	2					
D 1									1
H	1						1		
KZ	1♂					1♀		1♀	
Z	1								
KP							1		
H									
S	3	8	2	2	4	4	10	6	13
♀ 1	4	12	14	7	3	5	3	7	8
Z 3	12	15	8	8	2	7	1	9	15
♀ 2	1			1	3	4	6	9	33
G 100g	±100g	±100g	±100g	±150g	±150g	±100g	±100g	±100g	±100g
R									
K 1									
Z									
Ei									
Il 1						1			

De tarbot die 's voormiddags in de 2de sleep gevangen werd was een albino. In de 4de sleep vonden we een strandkrab met een krabbezakje. In Wenduine viel het wel erg op dat de zwemkrabben meestal groter, en de zwemkrabben meestal kleiner dan 3 cm waren.

	8/9/'79 Wenduine				Bredene 9/9/'79				
	20.45	21.15	21.40	22.05	9.20	9.35	9.50	10.15	10.40
	20.55	21.25	21.50	22.15	9.30	9.45	10.00	10.25	10.50
T	6	6	6	4	2		1	1	
S									
T		2	10	6	2	2		1	
P	11	8		11	9	2	1	1	
G			4	4	2			1	1
S		1							
B									
P		1	1	1					
Z									
5M	5	2	6	8					
S					1	1		1	
D		2		1					
H									
KZ					2♀		1♀+2♂	1♀	
Z									
KP							1		
W	1								
H			1						
S ♂	4	5	11	13	1	3	6		
♀	2	6	11	8	1	1	3	2	1
Z ♂	27	10	6	24	17	20	33	20	25
♀	30	26	20	26	12	10	12	7	9
G	↗	↗	↗	↗	±100g	±100g	±100g	±50g	±50g
R									
K									
Z								1	
Ei									
Il									1

De 2de sleep in Wenduine (zie vorige blz) leverde ook een strandkrab op met een krabbezakje op een afgebroken poot, en in de 6 de sleep werd ook bij één van de strandkrabben een krabbezakje aangetroffen. In Bredene gold dezelfde opmerking voor zwemkrabben als in Wenduine. ↗: garnalen niet meer geschat, maar de hoeveelheid per sleep steeg.